



Кандесартан

Кандесартан (атаканд, ордисс) относится к группе сартаны, блокаторы рецепторов ангиотензина II. **Останавливает сильное расширение сосудов.** В исследованиях примерно у 30–50% пациентов частота приступов снижалась минимум на 50%. Эффект заметен через 1-2 мес, принимают его 6-12 мес. Максимальная доза — 32 мг в день. Иногда результат 16 мг сопоставим с действием пропранолола 160 мг (x10 соотношение).

Схема приёма

1 неделя — 4мг утром, 4мг вечером

2 неделя — 4мг утром, 8мг вечером

Далее — 8мг утром, 8мг вечером

Побочные эффекты

Как и у всех лекарств, у небольшой части пациентов возможны побочные эффекты. Наиболее часто сообщаются:

- головокружение / ощущение вращения,
- инфекции дыхательных путей,
- пониженное артериальное давление,
- снижение количества лейкоцитов.

Особые указания

- Через 1 месяц после начала терапии необходимо выполнить анализы крови:
 - почечный профиль,
 - общий анализ крови.
- Если лечение прекращается, отмена должна быть постепенной.

Продолжайте увеличение дозы до тех пор, пока препарат не станет эффективно помогать или достижения максимальной дозы.

Off-label. Запрещен при беременности, необходима надежная контрацепция. Под наблюдением врача, рекомендации не заменяют инструкцию к препарату.